

Епидемиология на денталните заболявания

Мерки за честота, индекси на оралното здраве, методика на СЗО, глобално бреме и
рискови фактори

Упражнение 9 · Обществено дентално здраве · 2026/2027

гл. ас. д-р Костадин Костадинов, д.м.

Катедра по социална медицина и обществено здраве · Медицински университет – Пловдив

Какво ще можете след това упражнение

1. Да свързвате мерките за честота от упражнение 8 с денталните индекси.
2. Да изчислявате и тълкувате **DMFT/dmft**, **SiC**, индекса на грижа, **CPI**, **PI/GI**, **OHI-S** и индекса на общностна флуороза на **Dean**.
3. Да обяснявате защо СЗО използва **индексни възрасти** и pathfinder извадка.
4. Да описвате глобалното бреме на оралните болести и мястото на България.
5. Да свързвате захар, флуорид, тютюн и HPV с конкретни заболявания и мерки.

План на часа (90 мин)

0. Припомняне — 4 мин
1. Индекси на оралното здраве — 36 мин
2. Методика на СЗО — 8 мин
3. Бреме: светът и България — 12 мин
4. Рискови фактори и социален градиент — 13 мин
5. Задачи за самостоятелно решаване — 15 мин

Припомняне от упражнение 8: какво измерваме с индексите

Мярка	В денталната епидемиология
болестност	дял с нелекуван кариес ($D > 0$); дял на възрастните с джоб ≥ 6 mm. $DMFT > 0 =$ дял с кариесен опит
кумулятивна заболеваемост	дял на децата без кариес, които развиват кариес за 3 години
коэффициент на заболеваемост	нови кариозни повърхности на 100 човеко-години
средна стойност на индекс	среден DMFT, PI — тежест (интензитет); за CPI (подредени кодове) — разпределение по кодове

Кариесният опит е кумулативен

Веднъж засегнат, зъбът остава D, M или F. Затова **средният DMFT** описва натрупания кариесен опит към деня на прегледа (срезова мярка), а **прирастът на DMFT** показва новонатрупания кариесен опит. Той не отчита всички нови лезии: вторичен кариес на obtуриран зъб ($F \rightarrow D$) не променя DMFT.

Всеки индекс изисква уточнение: **възраст**, **праг** на диагнозата и **протокол** на прегледа.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Индекси на оралното здраве

- 2. Методика на СЗО за орални проучвания
- 3. Глобално бреме и България
- 4. Рискови фактори и социален градиент
- 5. Задачи

Какво е добър индекс и защо калибрираме изследователите

Индексът е **стандартизирана числова скала** за състояние в популация. Добрият индекс е:

- **валиден** — измерва това, което твърди;
- **надежден** — възпроизводим между и в рамките на изследователите;
- **прост и бърз** — приложим в теренни условия;
- **количествен** — позволява средни стойности и сравнение;
- **чувствителен** към промени и **приемлив** за изследваните.

Калибриране

Преди проучване изследователите оценяват едни и същи лица и съгласуваността им се изразява с **карпа на Cohen**. Обичаен праг: $\kappa \geq 0,60$; при подредени категории — претеглена карпа.

Индекс $\neq$ диагноза

Индексите описват лице и популация, но **не заменят** клиничната диагноза и плана на лечение.

DMFT / DMFS и dmft: кариесен опит

DMFT = брой постоянни зъби **D** (с кариес), **M** (извадени поради кариес), **F** (с obturation). Измерва **кариесния опит** — минал и настоящ.

- **DMFT**: 0–32 (C3O брой и мъдреците); **DMFS**: повърхности — 4 на фронтален, 5 на страничен зъб, до 148.
- **dmft** (временни зъби): 0–20; при 6–7-годишни липсващите резци не се броят като m.
- Зъбът се брои **веднъж**: пломба + вторичен кариес = D.
- **Не се броят**: силанти, коронки и мостове по некариозни причини, импланти.

Правило на C3O за M

Под 30 г.: само зъби, **извадени поради кариес**.

От 30 г.: всички зъби, загубени по каквато и да е причина (код 4 и 5) — затова при възрастни M не е чиста мярка за загуба поради кариес.

Ограничения

Липсва знаменател (броят зъби в риск) → винаги по възраст. D, M и F имат **еднакво тегло**. M и F зависят от решенията на зъболекаря. DMFT = 0 не означава „без кариес“, ако не се регистрират начални лезии.

Klein, Palmer & Knutson, 1938; WHO (2013), с. 47–48; Burt & Eklund, гл. 14

Решен пример: DMFT, SiC и индекс на грижа в един клас

Данни

12 деца на 12 г. Индивидуален DMFT:

0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7

Сумарно в групата: $D = 10$, $M = 1$, $F = 14$.

SiC (Significant Caries Index)

Среден DMFT на **третината** с най-висок кариесен опит (Bratthall, 2000). Предложена от Bratthall цел: $SiC < 3$ при 12-годишните до 2015 г.

Показател	Изчисление	Резултат
Среден DMFT	25 / 12	2,08
Дял с кариесен опит (DMFT > 0)	8 / 12	66,7 %
DMFT = 0 (при праг D3)	4 / 12	33,3 %
SiC (горните 4 деца)	$(7 + 5 + 4 + 3) / 4$	4,75
Индекс на грижа $100 \times \Sigma F / \Sigma DMFT$	14 / 25	56 %
Нелекуван дял $\Sigma D / \Sigma DMFT$	10 / 25	40 %

Средното 2,08 изглежда „ниско“ (под целта от 3), но една трета от класа има средно 4,75 засегнати зъба — кариесът е **поляризиран**.

ICDAS: кариесът като процес, не като „дупка“

Код	Критерий (визуален, след подсушаване)
0	здрава повърхност
1	първа видима промяна в емайла — обикновено след подсушаване (в фисурите — понякога и при влажен зъб)
2	ясна видима промяна в емайла — видима и при влажен зъб
3	локализиран дефект на емайла без видим дентин
4	тъмна сянка от дентина под интактен или нарушен емайл
5	ясна кавитация с видим дентин
6	обширна кавитация с видим дентин (над половината от повърхността)

Праг D1 и праг D3

D1 — всички стадии, включително начални лезии в емайла.

D3 — лезии до дентина (кавитация).
D1/D3 **не са** кодове на ICDAS; всяко проучване трябва изрично да посочи кои кодове включва.

Практическо следствие

При праг D1 болестността и DMFT са **по-високи**. Сравнения между държави и години са валидни само при **еднакъв праг** и протокол.

Пародонтални индекси: от CPITN към модифицирания CPI (C30, 2013)

CPITN — Ainamo и сътр. (1982)

Код	Находка	Нужда (TN)
0	здрав пародонт	0 — няма
1	кървене при сондиране	I — орална хигиена
2	зъбен камък / ретенция	II — I + почистване
3	джоб 4–5 mm	II
4	джоб ≥ 6 mm	III — комплексно лечение

6 секстанта; кодът на секстанта е най-високият; сонда на C30 с топче 0,5 mm.

CPI modified — C30 (2013)

- **Кървене:** всички налични зъби — 0 няма / 1 има.
- **Джобове** (от 15 г.): 0 — няма; 1 — 4–5 mm; 2 — ≥ 6 mm.
- **Загуба на прикрепване** (от 15 г., по секстанти, индексни зъби): 0 — 0–3 mm; 1 — 4–5; 2 — 6–8; 3 — 9–11; 4 — ≥ 12 mm.

Тежка пародонтална болест в оценките на C30/GBD: джоб ≥ 6 mm, CPI(TN) код 4 или загуба на прикрепване > 6 mm.

Хигиенни и гингивални индекси: PI, GI, OHI-S

Plaque Index (Silness & Løe, 1964)

0 — няма плака
1 — тънък слой, откриван само със сонда
2 — умерено, видимо с просто око
3 — обилни меки отлагания

Средно от 4 повърхности на 6 индексни зъба.

Gingival Index (Løe & Silness, 1963)

0 — нормална гингива
1 — леко възпаление, без кървене
2 — умерено: зачервяване, оток, **кървене при сондиране**
3 — тежко: изразен оток, разязвяване, спонтанно кървене

0,1–1,0 лек; 1,1–2,0 умерен; 2,1–3,0 тежък гингивит.

OHI-S (Greene & Vermillion, 1964)

DI-S + CI-S (меки отлагания + зъбен камък), всеки 0–3 на 6 повърхности: букални на 16, 26; лабиални на 11, 31; лингвални на 36, 46. DI-S = Σ оценки / брой изследвани повърхности; CI-S — аналогично.

Обхват 0–6: **0–1,2** добра; **1,3–3,0** задоволителна; **3,1–6,0** лоша хигиена.

Silness & Løe. Acta Odontol Scand. 1964;22:121–135. doi:10.3109/00016356408993968 · Løe & Silness. 1963;21:533–551. doi:10.3109/00016356309011240 · Greene & Vermillion. JADA. 1964;68:7–13

Флуороза: индекс на Dean и индекс на общностна флуороза (CFI)

Категория	Тег-ло	Критерий
нормален	0	гладък, гланцов, кремаво-бял емайл
съмнителен	0,5	единични бели петънца
много лек	1	бели непрозрачни зони < 25 % от повърхността
лек	2	бели зони 25–50 %
умерен	3	всички повърхности, износване, кафяви петна
тежък	4	хипоплазия, вдлъбнатини, корозирал вид

$$CFI = \frac{\sum n_i \times w_i}{N}$$

Пример (100 деца)

40 нормални, 20 съмнителни, 20 много леки, 12 леки, 6 умерени, 2 тежки:

$$(0 + 10 + 20 + 24 + 18 + 8) / 100 = \mathbf{0,80}$$

Лицето се оценява по двата най-засегнати зъба; ако се различават — по **по-малко засегнатия**; при съмнение — по-ниската категория. Теглата за CFI не са кодовете на СЗО (0–5). Исторически праг (Dean): CFI 0,4–0,6 гранично; > 0,6 — проблем за общественото здраве.

Dean HT. JADA. 1934;21:1421–1426. doi:10.14219/jada.archive.1934.0220; Burt & Eklund, гл. 19; WHO (2013), с. 51–52

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Индекси на оралното здраве
- 2. Методика на СЗО за орални проучвания**
3. Глобално бреме и България
4. Рискови фактори и социален градиент
5. Задачи

C30: Oral Health Surveys — Basic Methods, 5-о издание (2013)

Възраст	Защо е избрана
5 г.	кариес на временните зъби — променя се бързо; начало на училище
12 г.	глобална индикаторна възраст: последна лесно достъпна чрез училищата; обикновено са пробили постоянните зъби без мъдреците
15 г.	експозиция на постоянните зъби 3–9 г.; пародонт при юноши
35–44 г.	стандартна група възрастни: пълнен ефект на кариеса, тежък пародонтит, грижа
65–74 г.	перспектива на целия живот; планиране за възрастни хора

Pathfinder проучване

Стратифицирана клъстерна извадка: подгрупи с различни нива на болест (град/село, региони), **25–50 души** на възрастова група във всеки пункт. Пример: 12 пункта $\times$ 25 = 300 души за една възраст (25 при ниско ниво на болестта, около 50 — при високо). Подборът на пунктове определя обобщимостта — това не е вероятностна национална извадка.

Стандартизация

Единен формуляр, кодове, сонда на C30, обучение и калибриране, повторни прегледи.

WHO. Oral Health Surveys: Basic Methods, 5th ed. Geneva: WHO; 2013. ISBN 978-92-4-154864-9, с. 14–19

От целеви стойности на DMFT към всеобщо здравно покритие

Количествени цели

- **DMFT ≤ 3** при 12-годишните до 2000 г. (FDI/C3O) — постигната в много държави още през 90-те.
- **SiC < 3** при 12-годишните до 2015 г. (Bratthall, 2000) — насочва вниманието към най-засегнатата третина.

Рамка на СЗО 2021–2030

- Резолюция **WHA74.5** за оралното здраве (2021).
- **Глобална стратегия** за оралното здраве (решение WHA75(11), 2022).
- **Глобален план за действие 2023–2030** (решение WHA76(9), 2023): оралното здраве в програмите за НИЗ и в пакета на всеобщото здравно покритие.

Целта се измества от „средният DMFT да падне под 3“ към **равен достъп до профилактика и лечение** за всички групи.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Индекси на оралното здраве
2. Методика на СЗО за орални проучвания
- 3. Глобално бреме и България**
4. Рискови фактори и социален градиент
5. Задачи

Глобалното бреме: най-разпространените болести на човечеството


Състояние (2019, GBD)	Случаи	Болестност
нелекуван кариес, постоянни зъби (5+ г.)	≈ 2 млрд.	28,7 %
тежка пародонтална болест (15+ г.)	≈ 1 млрд.	18,8 %
нелекуван кариес, временни зъби (1–9 г.)	514 млн.	42,7 %
едентулизъм (20+ г.)	350 млн.	6,8 %
рак на устната и устната кухина (2020): нови случаи / смъртни случаи	377 713	177 757 починали

Какво следва от това

- Общо ≈ **3,5 млрд.** души (GBD 2019) — с около 1 млрд. повече от случаите на петте основни НИЗ, взети заедно.
- Случаите са нараснали с над 1 млрд. от 1990 г. (+50 %) — главно поради растежа и стареенето на населението.
- Разходи за орална грижа: близо **390 млрд. USD** годишно.

WHO. Global oral health status report (2022), ISBN 978-92-4-006148-4, табл. 2–9; GLOBOCAN 2020; болестността на пародонта и едентулизма е стандартизирана по възраст

България спрямо Европейския регион и света: нелекуван кариес (GBD 2019)



Сравняват се само показатели за нелекуван кариес, изчислени по еднакъв начин (без стандартизация по възраст) и в трите източника.

Профил на България (СЗО, 2022)

- Тежка пародонтална болест (15+ г.): **13,9 %**; едентулизъм (20+ г.): **13,5 %** (GBD 2019).
- 455 нови случая на рак на устната и на устната кухина (2020); 3,3 на 100 000 (стандартизирана заболеваемост).
- Захар: **74,4 g/ден** на човек (наличност, не измерен прием; 2019).
- Употреба на тютюн 15+ г. (2019, стандартизирана): **39,4 %**.
- 9 800 зъболекари (2019) — **14,0 на 10 000**.
- Разход за дентална грижа: 16 USD на човек (2019).

Какво показват български проучвания

Проучване	Група	Основен резултат
Künzel, 1996 (обзор)	12 г., Източна Европа	DMFT в България 3,1 — сред най-ниските в региона
Ivanova и сътр., 1995	6 г., детски градини	флуорирано мляко (1 mg F в дните на програмата, 180–200 дни/год.): dmft с 40 % по-нисък след 3,5 години; авторите посочват ограничения на дизайна
Онов и Белчева, 2020	12 г., Пловдив, n = 228	DMFT 1,57 в града и 2,92 в селата; без кариесен опит 38,4 % срещу 17,5 %
Kondeva и сътр., 2026	18 г., 2 общини, n = 480	квотна извадка; DMFT 7,48 : D 3,91, M 0,13, F 3,43 — D е около 52 % от DMFT

Локалните проучвания показват разлики: град–село, социалният статус и достъпът до грижа са свързани с това кой носи бремето.

Künzel W. Int J Paediatr Dent. 1996;6:221–226. doi:10.1111/j.1365-263x.1996.tb00249.x · Ivanova K et al. Adv Dent Res. 1995;9:120–121. doi:10.1177/08959374950090020701 · Onov MP, Beltcheva AB. Folia Med. 2020;62:159–164. doi:10.3897/folmed.62.e47894 · Kondeva V et al. Children. 2026;13:1087. doi:10.3390/children13081087

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Индекси на оралното здраве
2. Методика на СЗО за орални проучвания
3. Глобално бреме и България
- 4. Рискови фактори и социален градиент**
5. Задачи

Кариес: захарите — главният риск, флуоридът — главният защитен фактор

Свободни захари

- Систематичен обзор за СЗО (Moynihan & Kelly, 2014): 42 от 50 проучвания при деца откриват връзка захар–кариес; **умерено качество** на доказателствата, че кариесът е по-нисък при прием **< 10 %** от енергията.
- Насока на СЗО (2015): **< 10 %** от енергията (силна препоръка), **< 5 %** (условна).
- Значение имат и **количеството**, и **честотата** на приемите.

Флуорид

- Паста с флуорид: превантивна фракция **24 %** (95 % ДИ 21–28 %) — относително намаление на **прираста** на D(M)FS при деца спрямо паста без флуорид (Cochrane, 2003; 70 изпитвания в мета-анализа).
- По-висока концентрация → по-силен ефект; при малки деца (поглъщане докато зъбите се развиват) — и по-висок риск от флуороза (Walsh и сътр., 2019).
- Общностни мерки: флуориране на вода, сол или мляко.

Moynihan PJ, Kelly SAM. J Dent Res. 2014;93:8–18. doi:10.1177/0022034513508954 · WHO. Guideline: sugars intake (2015) · Marinho VCC et al. Cochrane 2003. doi:10.1002/14651858.CD002278 · Walsh T et al. Cochrane 2019. doi:10.1002/14651858.CD007868.pub3

Тютюн, алкохол, HPV и подходът на общите рискови фактори

Тютюн, алкохол, диабет

Тютюнопушенето е основен рисков фактор за **пародонтит**; диабетът (хипергликемията) също повишава риска. Тютюнът и алкохолът причиняват **рак на устната кухина**, като комбинацията им силно увеличава риска. В България 39,4 % от лицата на 15+ г. употребяват тютюн (СЗО, 2019).

HPV и рак на орофаринкса

SEER, САЩ, 1988–2004: заболеваемостта от **HPV-позитивен** рак на орофаринкса нараства с **225 %** (от 0,8 на 2,6 на 100 000), а от **HPV-негативен** спада с 50 % (Chaturvedi и сътр., 2011).

Подход на общите рискови фактори

Sheiham & Watt (2000): захар, тютюн, алкохол, хигиена и стрес са общи за оралните болести, сърдечно-съдовите болести, диабета и рака. Мерките на ниво **популация** — данъци върху подсладени напитки и тютюн, регулация на маркетинга, здравословна среда в училище — действат едновременно на много болести.

Chaturvedi AK et al. J Clin Oncol. 2011;29:4294–4301. doi:10.1200/JCO.2011.36.4596 · Sheiham A, Watt RG. Community Dent Oral Epidemiol. 2000;28:399–406. doi:10.1034/j.1600-0528.2000.028006399.x

Социален градиент: данни от кохортата в Дънидин (Нова Зеландия)

Около 1000 деца, родени 1972–1973 г., проследени от раждането; дентални прегледи на 5 и 26 години.

На 26 години	нисък СИС в детство- то	висок СИС в детство- то
пародонтална болест (загуба на прикрепване > 4 mm в ≥ 1 място)	31,1 %	11,9 %
≥ 4 повърхности, засег- нати от кариес	32,2 %	9,9 %

Болестност на 26 г. (не заболяемост). В това проучване възхо-
дящата социална мобилност **не заличава** ефекта на неблагоприят-
ното детство (Poulton и сътр., 2002).

Градиент по социални траектории

От най-малко към най-много болест на 26 г.:
висок–висок → **нисък–висок** → **висок–нисък**
→ **нисък–нисък** (Thomson и сътр., 2004).

Неравенствата в оралното здраве са **стъ-
паловидни**, а не само „бедни срещу бога-
ти“ — мерките трябва да обхващат целия
градиент.

Poulton R et al. Lancet. 2002;360:1640–1645. doi:10.1016/S0140-6736(02)11602-3 · Thomson WM et al. Community Dent Oral Epidemiol. 2004;32:345–353. doi:10.1111/j.1600-0528.2004.00173.x · Watt RG et al. Lancet. 2019;394:261–272. doi:10.1016/S0140-6736(19)31133-X

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Индекси на оралното здраве
2. Методика на СЗО за орални проучвания
3. Глобално бреме и България
4. Рискови фактори и социален градиент
- 5. Задачи**

Задачи за решаване в час

Задача 1 · DMFT

Пациент на 35 г.: кариес на 16 и 47; обтурации на 26, 36, 46; 37 и 18 са били налични и са загубени (причината не е известна); силант на 27; корона на 11 след травма. Изчислете DMFT.

Задача 2 · SiC

9 деца на 12 г.: DMFT 0, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 6, 8. Изчислете средния DMFT, дела с кариесен опит и SiC.

Задача 3 · Заболеваемост

В началото на годината в дом за възрастни има 120 обитатели с поне един естествен зъб. Всички са проследени 1 година; 18 стават беззъби. Колко е кумулативната заболяемост на едентулизъм?

Задача 4 · CFI

50 деца: 25 нормални, 10 съмнителни, 10 много леки, 5 леки. Изчислете CFI и го тълкувайте.

Отговори

Задача	Решение	Отговор
1	$D = 2$ (16, 47); $F = 3$ (26, 36, 46); $M = 2$ (37, 18 — от 30 г. се броят всички липсващи); силантът и коронката след травма не се броят	DMFT = 7
2	сума $24 / 9 = 2,67$; кариесен опит $7 / 9 = 77,8 \%$; SiC = $(8 + 6 + 3) / 3$	2,67; 77,8 %; 5,67
3	$18 / 120$ за 1 година	15 % за една година
4	$(25 \times 0 + 10 \times 0,5 + 10 \times 1 + 5 \times 2) / 50 = 25 / 50$	CFI = 0,50 — гранична зона, под прага 0,6

Без знаменател, праг и период числото не означава нищо — проверявайте ги при всяко сравнение.

Измерване

1. Болестността е „снимка“; заболяемостта — „филм“ на новите случаи сред лицата в риск.
2. DMFT е **кумулятивен** кариесен опит; SiC показва най-засегнатата третина.
3. Сравнявайте само индекси с **еднакъв праг**, протокол и възраст.
4. Индексните възрасти и pathfinder извадката на C3O правят данните сравними.

Бреме и причини

1. Оралните болести засягат $\approx 3,5$ млрд. души (GBD 2019; $\approx 3,7$ млрд. по GBD 2021).
2. България: висок нелекуван кариес и едентулизъм, висока употреба на тютюн.
3. При кариеса захарта е главният рисков, флуоридът — главният защитен фактор.
4. Неравенствата са **стъпаловидни** и започват в детството.

Следващото упражнение: **епидемиологични проучвания**.

Благодаря за вниманието!